


CIMEGA



Eigenschappen

- | | |
|---------------------------|--|
| • Gebruik: | Vers consumptie |
| • Rijptijd: | vrij vroeg (7) |
| • Opbrengst: | zeer hoog |
| • Loof: | vlotte opkomst met opvallend groot eerste blad |
| • Knolgrootte: | midden-grof |
| • Knolvorm: | ovaallang tot langovaal |
| • Knollen per plant: | 12-14 knollen |
| • Huidkleur: | geel |
| • Vleeskleur: | lichtgeel |
| • Kooktype: | AB |
| • Drogestof gehalte: | vrij laag |
| • Kiemrust: | midden (6,5) |
| • Nematoden resistentie: | Ro 1 |
| • Wratziekte resistentie: | resistent, type 1 |
| • Phytophthora loof: | vatbaar |
| • Phytophthora knol: | vrij sterk |
| • Schurft: | redelijk goed (6,5) |
| • Interne gebreken: | zeer weinig vatbaar |
| • Virus resistentie: | gemiddeld |

Teelt & bewaring

Is zeer goed bewaarbaar buiten de koeling tot januari. Ondanks goede kiemrust is de opkomst vlot na het planten in de vroege export bestemmingen. De kiemrust is langer dan bij Spunta en daarom adviseren we om het ras Cimega voor te kiemen of een warmte stoot te geven voor het poten.

Zorg voor een brede rug en plant enkele centimeters dieper dan normaal om groene knollen te voorkomen.

Pootafstand afhankelijk van de gewenste maat bij oogst en potmaat. Het ras laat zich prima vergelijken hier met Spunta qua knollenaantal en maat, maar heeft doorgaans een iets fijnere sortering.

In de pootgoedteelt een bemesting als Spunta aanhouden. Zeker niet meer stikstof geven, eerder 5 % minder voor een betere afrijping.



Bespuiting tegen Alternaria/Sclerotinia (o.a. Signum) wordt aangeraden.

Niet gevoelig voor Sencor

Tips & gebruik

In de pootgoedteelt is het van groot belang de teelt aan te vangen met een zeer laag virus niveau. Het ras is niet extra gevoelig voor Y-virus maar de selecteerbaarheid hierop wordt later in het groeiseizoen beduidend minder. Daarom wordt dringend oliebescherming geadviseerd om latere teleurstellingen te voorkomen.

De teler dient de partij vóór het sorteren tot minimaal 12°C op te warmen. Hiermee wordt de kiemrust doorbroken en zijn knollen minder kwetsbaar voor beschadigingen. Zorg voor het in acht nemen van een goede wondhelingsperiode nadat de aardappelen zijn gesorteerd en voorkom een te snelle terug koeling van het gesorteerde product.

Cimega heeft de eigenschap vrij snel na de oogst verwerkbaar te zijn mits goed droog en afgehard.

